

1. Біль у грудях/Гострий коронарний синдром/Інфаркт міокарду

1.1. Нітрогліцерин одна таблетка 0,5 мг під язик, можна повторити через 5 хв, якщо тиск >100 мм.рт.ст.

+

1.2. Ацетилсаліцилова кислота 1\4 таблетки 162мг розжувати.

2. Гіпертонічний криз

2.1. Каптоприл таблетка 25 мг під язик , за необхідності повторити через 90-120хв до 100 мг сумарної дози.

або

2.2. Фармадипін 5 крапель під язик + пропранолол 20мг

або

2.3 Магнію сульфат розчин 25% ампула 5 мл +15мл 0,9 % фізіологічного розчину NaCl внутрішньовенно, якщо АТ >200 мм. рт.ст.

3. набряк легень

якщо АТ >160 мм. рт.ст

3.1 Нітрогліцерин 2 таблетки 0,8 мг під язик кожні 5 хв під контролем Артеріального тиску

якщо АТ >200 мм. рт.ст

3.2. Нітрогліцерин 3 таблетки 1,2 мг під язик кожні 5 хв під контролем Артеріального тиску

або

3.3 Нітрогліцерин ампула 1% 1 мл +200 мл фізіологічного розчину NaCl внутрішньовенно 30мл/годину

якщо АТ <100 мм. рт.ст

3.4 Дофамін ампула 4% 5 мл + 200 мл фізіологічного розчину NaCl внутрішньовенно 30мл/годину

Анафілактичний шок

1. АДРЕНАЛІН

Дорослі

**Адреналін 0,1% ампула 1 мл ---- ввести 0,5 мл
в/м у верхньо-зовнішню поверхню стегна,**

якщо зберігаються симптоми , можна повторити кожні 5- 15 хв в тій же

дозі

Діти

**Адреналін 0,1% ампула 1 мл ---- ввести 0,2 мл
в/м у верхньо-зовнішню поверхню стегна,**

якщо зберігаються симптоми , можна повторити кожні 5- 15 хв в тій же дозі

2. САЛЬБУТАМОЛ 1- 2 дози інгалятором, якщо порушене дихання

3. ДИМЕДРОЛ 1% ампула 1 мл

Дорослі - 2 мл (2 ампули) внутрішньомязево

Діти - 1 мл (1 ампула) внутрішньомязево

4. 20 мл/кг фізіологічного розчину NaCl внутрішньовенно

5. Якщо після попередніх кроків $AT < 90$, то продовжити введення адреналіну у вену -(1мл Адреналін +400 мл NaCl 0,9%) через екзадроп із початковою швидкістю 30мл\год під контролем AT.

Гіпоглікемія

1. Якщо пацієнт в свідомості

Глюкоза пероральн (цукор, цукерки, мед)

2. Якщо пацієнт безсвідомості

Глюкоза 40% ампула 20 мл - ввести 10 мл (півампули) лише внутрішньовенно

Глюкоза 40% ампула 20 мл - ввести 40-60 мл(2-3 ампули) лише внутрішньовенно

БРОНХІАЛЬНА АСТМА (БРОНХОСАЗМ) приступ

1. Сальбутамол спрей інгаляційний 100мкг/доза - 1 доза кожні 10 хв до зменшення задишки

+

2. Іправент 40 мкг /доза - 1 доза одноразово

+

3. Дексаметазон ампула

ДІТИ 1мл ввести внутрішньовенно + 19,0 мл 0,9 % фізіологічного розчину NaCl

Дорослі 2мл ввести внутрішньовенно + 19,0 мл 0,9 % фізіологічного розчину NaCl

ЗУПИНКА СЕРЦЯ

- 1. Компресія грудної клітки з частотою 100 натискувань за хвилину безперервно**
- 2. Штучна вентиляція легень мішком Амбу через маску та повітропровід - 2 вдихи через кожні 30 компресій**
- 3 . Забезпечити внутрішньовенний доступ**
- 4. Адреналін 0,1% 1 мл ввести внутрішньовенно , повторювати введення кожні 5 хвилин реанімації**
- 5. Атропін 0,1% ввести внутрішньовенно одноразово**
- 6. Продовжувати до приїзду ЕМД, або до появи ознак біологічної смерті**